



PROCESSO SELETIVO

Fundação Municipal de Saúde - FMS / 2017



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – PROVA TIPO 17
ESPECIALIDADE: **MÉDICO GINECOLOGISTA**
DATA: 20/08/2017 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material supramencionado e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **3 (três) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h 30min (duas horas e trinta minutos)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

PROCESSO SELETIVO - FMS / 2017

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

Nº DE INSCRIÇÃO						

TEXTO 01 (Para as questões de 01 a 08).

A CULPA É DOS PAIS?

Novos estudos mostram que o desleixo da família à mesa é uma das causas de um mal crescente: a obesidade infantil.

(...)

A probabilidade de uma criança gorda ser um adulto igualmente roliço é altíssima. Um dos motivos: o número de células adiposas, que retêm gordura, conhecidas como adipócitos, é geralmente definido até os 20 anos. Depois dessa idade, nada é capaz de diminuir a quantidade de adipócitos, nem a mais radical das dietas. Quando uma pessoa emagrece, os adipócitos apenas perdem volume, mas continuam lá. A quantidade dessas células adiposas acumulada nas primeiras duas décadas de vida é determinada por dois fatores: genética e hábitos alimentares. A influência da dieta é enorme. Imaginemos alguém programado geneticamente para ter 70 bilhões de células adiposas. Se, na infância e na adolescência, essa pessoa foi acostumada a comer de forma saudável, ela pode driblar a genética e nunca atingir a quantidade de adipócitos determinada pelos genes. “Mas, em geral, ocorre o contrário – come-se muito mal e desde cedo”, diz Claudia Cozer Kalil, endocrinologista e coordenadora do Núcleo de Obesidade e Transtornos Alimentares do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo.

(...)

(Revista Veja - Editora ABRIL – edição 2509 – ano 49 – nº 51 – 21.12.2016 – pag.117-118. Por Carolina Melo e Thais Botelho)

QUESTÃO 01

A frase-subtítulo do texto: *Novos estudos mostram que o desleixo da família à mesa é uma das causas de um mal crescente: a obesidade infantil*, nos informa e nos permite compreender que a “obesidade infantil”

- a) tem sido negligenciada pelos estudiosos da saúde.
- b) é muito pesquisada, mas sem uma atenção especial ao tipo de alimento ingerido pelas crianças.
- c) não tem merecido a devida atenção, mesmo com as evidências de que os nutrientes contidos nos alimentos nem sempre fazem bem à saúde.
- d) já foi pesquisada em outros momentos, mas sem levar em conta os hábitos e comportamentos alimentares das famílias.
- e) é um tema pouco discutido, já que não há uma preocupação sistemática com a saúde de crianças e adolescentes.

QUESTÃO 02

O texto é desenvolvido de forma a oferecer resposta à pergunta proposta no título. Essa resposta é apresentada por meio de

- a) questionamentos sobre atitudes incorretas, apontados por pessoas mais experientes.
- b) afirmações sobre o comportamento humano advindas do senso comum.
- c) explicações de natureza científica.

- d) interrogações novas sobre problemas relacionados à alimentação infantil.
- e) informações de conteúdos apresentados em relatórios sobre nutrição saúde.

QUESTÃO 03

A opção na qual palavra(s)/expressão(ões) destacada(s) são empregada(s) em sentido conotativo é:

- a) *A probabilidade de uma criança gorda ser um **adulto igualmente roliço** é altíssima.*
- b) *nada é capaz de diminuir **a quantidade de adipócitos**, ...*
- c) *Quando **uma pessoa emagrece**, os adipócitos apenas perdem volume, ...*
- d) *Se, **na infância e na adolescência**, essa pessoa foi acostumada a comer de forma saudável,...*
- e) *“Mas, em geral, **ocorre o contrário**...”*

QUESTÃO 04

Dentre as palavras negritadas, nas opções abaixo, aquela que apresenta função morfológica diferente das demais é

- a) ... é **geralmente** definido até os 20 anos.
- b) Mas, **em geral**, ...
- c) ... ela pode driblar a genética e **nunca** atingir a quantidade de adipócitos ...
- d) ... come-se **muito** mal ...
- e) ... **nem** a mais radical das dietas.

TRECHO PARA AS QUESTÕES 05 E 06.

Imaginemos alguém programado geneticamente para ter 70 bilhões de células adiposas. **Se**, na infância e na adolescência, **essa pessoa** foi acostumada a comer de forma saudável, ela pode driblar a genética e nunca atingir a quantidade de adipócitos determinada pelos genes.

QUESTÃO 05

Nas línguas, em geral, contamos com recursos que garantem retomadas de palavras, expressões e similares, com objetivo de manter a coesão dos textos que produzimos. No trecho acima, **essa pessoa** retoma, no texto, o que se negritou em

- a) ... **os adipócitos** apenas perdem volume, ...
- b) A probabilidade de **uma criança gorda** ser um adulto igualmente roliço é altíssima.
- c) A probabilidade de uma criança gorda ser **um adulto** igualmente roliço é altíssima.
- d) Imaginemos **alguém** programado...
- e) Setenta bilhões de **células adiposas**...

QUESTÃO 06

O sentido da palavra **Se**, contextualmente, confere ao contexto uma relação de

- a) finalidade.
- b) condição.
- c) explicação.
- d) contradição.
- e) dúvida.

TRECHO PARA A QUESTÃO 07.

Quando uma pessoa emagrece, os adipócitos apenas perdem volume, mas continuam lá.

QUESTÃO 07

Assinalar a opção que contém uma informação **CORRETA** sobre o período acima.

- a) ... **os adipócitos apenas perdem volume**, é a oração principal desse período composto.
- b) O período em questão é formado, em sua totalidade, por uma oração principal e uma oração coordenada.
- c) ... **mas continuam lá** é uma das orações subordinadas que entram na composição do período.
- d) **Quando uma pessoa emagrece**, ... é uma das orações coordenadas que entram na composição do período.
- e) A palavra **Quando** introduz uma oração coordenada.

QUESTÃO 08

Sobre a estrutura morfossintática do trecho ... *come-se muito mal e desde cedo* ... está **incorreto** apenas o que se afirma em:

- a) ... **come-se muito mal** ... – trata-se de uma oração com sujeito indeterminado.
- b) antes do segmento **desde cedo** subentende-se a repetição **come-se**.
- c) em **muito mal**, o primeiro termo é intensificador do segundo termo.
- d) em ... **come-se muito mal e desde cedo** ..., o **e** é uma palavra que tem função conectiva.
- e) o segmento **muito mal** constitui um termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto.



(www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economica2013/08/26; Acesso em 11.7.2017)

QUESTÃO 09

O texto acima, por ser uma charge, tem como um dos seus propósitos comunicativos apresentar uma crítica a fatos sociais do cotidiano. Assim sendo, a crítica, nesse texto, estabelece-se a partir do efeito de humor provocado

- a) pelo desconhecimento do paciente sobre a necessidade que ele tem de contar com um plano de saúde para ser atendido.
- b) pela postura física de descontração da atendente ao se dirigir ao paciente.
- c) por um conjunto de fatores, dentre eles a quebra de expectativa na interpretação que o paciente faz a respeito da assertiva/indagação da atendente.
- d) pela incapacidade que o paciente demonstra em perceber que ali não há atendimento gratuito.
- e) pela postura física do paciente ao ouvir a assertiva/indagação da atendente.

QUESTÃO 10

Sobre a estrutura sintática dos recursos verbais presentes na charge **O SENHOR TEM PLANO DE SAÚDE ...** e **ISSO É GRAVE?** É correto afirmar que **PLANO DE SAÚDE** e **GRAVE** constituem, respectivamente,

- a) objeto direto e predicativo do sujeito.
- b) objeto direto e objeto direto.
- c) objeto indireto e predicativo do sujeito.
- d) objeto indireto e objeto indireto.
- e) objeto direto e predicativo do objeto.

QUESTÃO 11

Em relação à legislação estruturante do Sistema Único de Saúde do Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho.
- b) A articulação das políticas e programas do Sistema Único de Saúde, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador.
- c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- d) À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, dentre outras ações, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e as relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- e) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo somente as instituições públicas federais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

QUESTÃO 12

De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Atenção Básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, **EXCETO**:

- a) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária;
- b) Ser resolutive ao identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo;
- c) Ser capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais;
- d) Coordenar o cuidado por meio da elaboração, acompanhamento e gestão de projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.
- e) Ordenar as redes por meio do reconhecimento das necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde definida no nível central do Sistema Único de Saúde contemple as necessidades de saúde dos usuários.

Leia o texto abaixo para responder as questões 13 a 15:

Tupãssi registra quase 80 casos de vômito e diarreia em uma semana

O Hospital Municipal de Tupãssi, no oeste do Paraná, registrou 77 casos de vômito e diarreia em uma semana, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. [...]. Dos casos registrados na cidade, 08 funcionários do hospital também apresentarem os sintomas [infectados no local de trabalho ou na comunidade?]. A pasta afirma que ainda não sabe o que pode ter causado o problema, mas suspeita de que as causas podem estar ligadas a alguma bactéria ou virose [...].

A primeira suspeita analisada pelo município foi de que a água da torneira do hospital pudesse estar contaminada, mas os testes realizados pela 20ª Regional de Saúde apontaram resultado negativo para contaminação. "Nós encaminhamos a água para análise no laboratório da 20ª regional e no sábado passado já deu resultado negativo [para vírus e bactérias?]. A partir disso, nós começamos a procurar outros meios (...) para buscarmos a solução e encaminharmos o diagnóstico preciso com relação ao que está acontecendo hoje no município", conta o secretário de saúde de Tupãssi, Lari Pedro Nunes.

Enquanto os resultados de novas análises não são divulgados, a orientação do município é para que os moradores se atentem à higiene pessoal, reforçando a lavagem das mãos todos os dias.

Fonte: <http://www.promedmail.org/pt>

QUESTÃO 13

Ao recomendar a lavagem das mãos todos os dias, mesmo sem saber qual a etiologia do fenômeno descrito, a autoridade municipal adotou uma medida de prevenção classificada como:

- a) Prevenção primária – promoção da saúde
- b) Prevenção primária – proteção específica
- c) Prevenção secundária – diagnóstico precoce
- d) Prevenção secundária – limitação do dano
- e) Prevenção terciária – reabilitação

QUESTÃO 14

Considerando a Portaria GM/MS nº 204/2016, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Por não constar explicitamente na lista de doenças e agravos de notificação compulsória, o fenômeno descrito não deve ser notificado às autoridades sanitárias do município.
- b) Por não constar explicitamente na lista de doenças e agravos de notificação compulsória, o fenômeno descrito poderia ter sido notificado às autoridades sanitárias do município, caso o resultado das análises laboratoriais apontasse a presença de algum patógeno causador de doença constante na referida lista.
- c) A notificação compulsória será realizada somente após a confirmação de doença ou agravo, observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- d) Apesar de não constar explicitamente na lista de doenças e agravos de notificação compulsória, o fenômeno relatado deve ser notificado, pois representa uma situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública.

- e) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória não pode ser realizada à autoridade de saúde, por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.

QUESTÃO 15

O fenômeno descrito caracteriza o aumento inusitado do número de casos de uma doença ou agravo em um curto período de tempo, denominado:

- a) Epidemia
- b) Pandemia
- c) Endemia
- d) Zoonose
- e) Epizootia

QUESTÃO 16

O predomínio relativo das condições crônicas tende a aumentar em razão da produção social de condições crônicas a partir de prevalência significativa e em geral crescente dos determinantes sociais da saúde, como:

- a) Imunização.
- b) Excesso de peso.
- c) Sedentarismo.
- d) Renda insuficiente.
- e) Tabagismo.

QUESTÃO 17

O processo de planejamento está mencionado no art. 165 da Constituição Federal, dando responsabilidades ao Poder Executivo de elaborar planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Da mesma forma, a Lei n. 8.080/1990 define que União, estados, Distrito Federal e municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, **EXCETO**:

- a) elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
- b) elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde, de conformidade com o plano de saúde;
- c) planejamento e orçamento descendentes, do nível federal até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos;
- d) articulação da política e dos planos de saúde;
- e) utilização dos planos de saúde como base das atividades e das programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, considerando o financiamento previsto na respectiva proposta orçamentária.

QUESTÃO 18

“O planejamento estratégico em saúde é caracterizado por uma mudança no entendimento do papel do gestor governamental no processo de elaboração e de implementação das políticas. O enfoque estratégico pressupõe que o planejador é um ator social, ou seja, é parte de um “jogo” no qual existem outros atores, com interesse e força distintos”.

Frente à operacionalização e aplicação do método do planejamento estratégico em saúde, analise as assertivas abaixo e assinale a única **CORRETA**:

- a) O planejamento pode ser definido como o processo pelo qual se determina que caminhos devem ser tomados para se chegar a um situação indefinida.
- b) O processo de planejamento em saúde consiste, basicamente, em: identificar problemas, identificar fatores que contribuem para a situação observada, identificar prioridades de intervenção, definir estratégias e quem vai executá-las, avaliar e monitorar as ações executadas.
- c) O planejamento em saúde não pode ser um instrumento flexível, pois embora expresse os resultados de todo o processo de diagnóstico, de análise e de elaboração técnica e política, acordos e pactos, sua utilidade é a de servir como bússola para nortear as atividades que são/serão realizadas.

- d) O plano de saúde, nada mais é do que apenas a expressão dos desejos de quem o planeja, ou seja, simplesmente uma declaração de como o mundo “deveria ser”.
- e) A atividade de planejamento é dividida em três momentos: estratégico, tático e operacional. Este último refere-se à definição da condução do processo de planejamento, à sua determinação no espaço da política e contempla os processos que se relacionam com as mudanças estruturais ou organizacionais de médio e longo prazo.

QUESTÃO 19

Observe o trecho relativo à divulgação da Pesquisa Nacional de Saúde, inquérito de base domiciliar realizada no Brasil em 2013: “Das 200,6 milhões de pessoas residentes no Brasil [em 2013], 6% (12,1 milhões) ficaram internadas em hospitais por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista. A regiões que apresentaram proporções superiores à média nacional foram Sul (7,5%) e Centro-Oeste (7,4%). Tratamento clínico e cirurgia foram os dois tipos de atendimento mais frequentes nos casos de internação, sendo 42,4% e 24,2% em estabelecimentos de saúde pública. Em instituições privadas, os pesos se invertem: 29,8% procuraram tratamento clínico e 41,7%, cirurgias.

Os valores apresentados em percentuais se referem a um indicador de saúde, sobre o qual é **CORRETO** afirmar:

- a) Trata-se da taxa de internação hospitalar segundo região geográfica, tipo de tratamento (clínico ou cirurgia) e de serviço (público e privado).
- b) Demonstra que o risco de um brasileiro ser internado para tratamento clínico foi maior nos estabelecimentos de saúde pública.
- c) Trata-se da taxa de prevalência de internações hospitalares referidas pelos entrevistados segundo região geográfica, tipo de tratamento (clínico ou cirurgia) e de serviço (público e privado).
- d) Demonstra que a probabilidade de um brasileiro vir a ser internado para tratamento clínico é maior nos estabelecimentos privados de saúde.
- e) Trata-se da taxa de incidência de internações hospitalares referidas pelos entrevistados segundo região geográfica, tipo de tratamento (clínico ou cirurgia) e de serviço (público e privado).

QUESTÃO 20

A vigilância em saúde “está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador”. Assinale a alternativa que contém informação **INCORRETA** sobre os tipos de vigilância em saúde:

- a) Vigilância em saúde do trabalhador - caracteriza-se como um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- b) Vigilância epidemiológica - conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde.
- c) Vigilância sanitária - abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde (incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados à saúde.
- d) Vigilância epidemiológica - conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.
- e) Vigilância em saúde ambiental - monitora fatores que podem interferir na saúde humana como: água para consumo humano, ar, solo, desastre naturais, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos e fatores físicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Paciente de 56 anos de idade procura serviço médico queixando-se de nódulo na mama direita há dois meses, com aumento progressivo de tamanho e indolor. De antecedentes, relatava dois partos normais a termo, um aos 22 anos e o outro aos 26 anos de idade. Não relatava nenhum caso de câncer de mama na família. Relatava que havia realizado uma mamografia há nove meses que foi normal, mas não tem mais os filmes da mamografia. Ao exame físico apresentava um nódulo endurecido, irregular medindo cerca de 2 cm no maior diâmetro localizado no quadrante superior externo da mama direita. A axila não apresentava linfonodo palpável. Das condutas abaixo a mais apropriada como abordagem inicial, é:

- a) Solicitar uma mamografia bilateral.
- b) Proceder à exérese do nódulo imediatamente.
- c) Pedir para que retorne em dois meses para ser realizado novo exame físico.
- d) Solicitar uma ressonância magnética das mamas.
- e) Indicar mastectomia, pois a lesão é claramente maligna.

QUESTÃO 22

Paciente de 60 anos de idade procura a Unidade Básica de Saúde para exame de rotina, pois deseja realizar exame complementar para diagnóstico precoce de câncer de mama. Refere que nunca realizou mamografia. Ao exame clínico, as mamas e axilas estão normais. Qual a conduta:

- a) Solicitar uma ultrassonografia mamária, pois apresenta maior sensibilidade para diagnóstico de câncer de mama.
- b) Solicitar uma ressonância magnética das mamas, pois apresenta maior especificidade para o diagnóstico de câncer de mama.
- c) Solicitar uma mamografia bilateral.
- d) Solicitar mamografia e ultrassonografia mamária.
- e) Solicitar mamografia e ressonância magnética das mamas.

QUESTÃO 23

Paciente de 50 anos de idade está na menopausa e sintomática. Procura unidade de saúde para se informar sobre reposição hormonal. Das alternativas abaixo qual a **INCORRETA** sobre reposição hormonal na menopausa:

- a) A reposição hormonal com estrogênio e progesterona aumenta o risco de câncer de mama segundo o estudo WHI (*Women's Health Initiative*)
- b) A reposição com estrogênio não aumenta o risco de câncer de mama segundo o estudo WHI (*Women's Health Initiative*)
- c) A terapia estrogênica local tem pouco efeito sobre a vaginite atrófica na menopausa, devendo-se utilizar estrogênio sistêmico sempre
- d) O estudo WHI (*Women's Health Initiative*) não encontrou aumento do risco de câncer de ovário
- e) Pacientes na menopausa que tiveram câncer de mama não devem receber reposição hormonal.

QUESTÃO 24

Sobre a anatomia uterina é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A artéria uterina é ramo da artéria íliaca interna.
- b) A artéria uterina não se anastomosa com a artéria ovárica.
- c) A artéria uterina envia ramos para o corpo e colo do útero, e para a porção superior da vagina.
- d) O peritônio recobre a maior parte do útero e o colo posteriormente.
- e) O ligamento largo é uma camada dupla de peritônio que cobre o suprimento neurovascular para o útero e se insere no corpo, no colo uterino e na parede pélvica.

QUESTÃO 25

Pacientes com dor pélvica crônica representam um desafio para o médico ginecologista. Uma das causas de dor pélvica crônica são as aderências pélvicas. É **CORRETO** afirmar sobre as aderências pélvicas, **EXCETO**:

- a) É mais frequente em pacientes que se submeteram a laparotomia por incisão mediana.
- b) A ultrassonografia apresenta baixa sensibilidade para o diagnóstico.
- c) Podem determinar abdome agudo obstrutivo.
- d) Podem ser decorrentes de endometriose.
- e) Devem ser tratadas por laparotomia, não tendo nenhum papel a videolaparoscopia.

QUESTÃO 26

Paciente de 35 anos de idade procura o serviço de urgência por apresentar atraso menstrual associado a náuseas e vômitos. Ao exame clínico paciente encontra-se estável hemodinamicamente, colo do útero normal e discreta dor à mobilização do colo uterino. Na ultrassonografia foi detectada gravidez ectópica em trompa direita, medindo 2.9cm, sem embrião vivo, beta-HCG baixo e com baixo fluxo trofoblástico à dopplervelocimetria. Qual a conduta mais adequada para este caso:

- a) Laparotomia imediata.
- b) Laparoscopia imediata.
- c) Tratamento conservador com metotrexate.
- d) Programar laparotomia eletiva, já que não se trata de uma urgência médica.
- e) Programar laparoscopia eletiva, já que não se trata de uma urgência médica.

QUESTÃO 27

É **CORRETO** afirmar sobre o cisto do canal de Nuck:

- a) É um cisto que ocorre na trompa uterina.
- b) Ocorre devido à falta de fechamento do processo vaginal peritoneal.
- c) Ocorre na parede vaginal posterior no terço superior.
- d) Faz diagnóstico diferencial com hérnia umbilical.
- e) Estes cistos são geralmente sintomáticos.

QUESTÃO 28

A infecção por Clamídia possui alta prevalência em mulheres. É **CORRETO** afirmar sobre infecção por Clamídia em mulheres:

- a) A *Chlamydia trachomatis* é uma bactéria gram-negativa e aeróbica.
- b) Não aumenta o risco de gravidez ectópica.
- c) Não está associada à ocorrência de artrite.
- d) Não está associada a sintomas sistêmicos.
- e) Quando ocorre acometimento da glândula de Bartholin, em 50% dos casos ocorre infecção associado com *Neisseria gonorrhoeae*.

QUESTÃO 29

Mulher jovem dá entrada no serviço de urgência queixando-se de dor no quadrante superior direito do abdome, febre, náuseas e vômitos e com clínica de salpingite. A principal hipótese diagnóstica é:

- a) Colecistite aguda.
- b) Colangite.
- c) Abscesso hepático.
- d) Peri-hepatite (Síndrome de Fitz-Hugh-Curtiz).
- e) Apendicite aguda complicada.

QUESTÃO 30

Sobre a candidíase vaginal é **CORRETO** afirmar, **EXCETO**:

- a) A relação entre candidíase vaginal e a atividade hormonal fica evidente perante o fato de que raramente a cândida é isolada em adolescentes antes da menarca.
- b) A prevalência de candidíase é maior na menopausa.
- c) Durante a infecção, o fungo encontra-se na forma de pseudo-hifas.
- d) A portadora assintomática apresenta o fungo na forma leveduriforme.
- e) A Cândida tem acesso à vagina, a partir da região perianal.

QUESTÃO 31

A endometriose é uma doença que apresenta morbidade significativa para as mulheres na fase reprodutiva de suas vidas. O conhecimento sobre esta doença tem avançado muito nos últimos anos. É **CORRETO** afirmar sobre a endometriose, **EXCETO**:

- a) a manutenção e o crescimento dos implantes endometrióticos não são estimulados pelo estrogênio.
- b) mulheres predisposta à endometriose apresentam redução na apoptose no endométrio.
- c) o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) encontra-se aumentado nas pacientes com endometriose.
- d) o fluido peritoneal de pacientes com endometriose apresenta alto número de macrófagos, porém com menos atividade fagocítica.
- e) o gene HOX tem sido relacionado com a origem da doença.

QUESTÃO 32

Paciente de 35 anos de idade com infertilidade e dor pélvica intensa e persistente com piora nos últimos meses associada ao período menstrual. Ao exame clínico apresenta dor importante à mobilização do colo do útero e presença de focos endometrióticos na parede vaginal posterior. Uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal demonstrou tratar-se de endometriose pélvica profunda comprometendo útero, ovários e intestino. Qual o sítio intestinal mais frequentemente acometido na endometriose:

- a) Ânus.
- b) Apêndice, pois fica livre na pelve.
- c) Retosigmóide.
- d) Íleo terminal.
- e) Cólon descendente.

QUESTÃO 33

Paciente de 35 anos de idade apresenta descarga papilar uniductal, espontânea e sanguinolenta há três meses. Qual a principal hipótese diagnóstica:

- a) Adenoma de papila mamária.
- b) Ectasia ductal.
- c) Carcinoma ductal infiltrante.
- d) Carcinoma *in situ*.
- e) Papiloma.

QUESTÃO 34

O vírus do papiloma humano(HPV) está associado ao câncer do colo uterino. Qual a alternativa que contém os sorotipos de alto risco para câncer do colo do útero?

- a) 6,11,18, 42
- b) 16, 42, 43,44
- c) 16, 18, 45,56
- d) 16, 18, 31,42
- e) 16, 18,33,44

QUESTÃO 35

Paciente de 45 anos de idade foi diagnosticada com carcinoma *in situ* do colo do útero. Na colposcopia apresenta lesão de 1 cm no lábio anterior(iodo negativo). Levando-se em consideração que a paciente tem prole constituída e já fez laqueadura tubária, qual a melhor indicação para o tratamento do carcinoma *in situ*?

- a) Histerectomia simples com salpingectomia.
- b) Histerectomia com salpingectomia e ooforectomia bilateral.
- c) Histerectomia simples.
- d) Histerectomia radical com pesquisa de linfonodo sentinela.
- e) Conização.

QUESTÃO 36

Paciente de 52 anos de idade procura unidade básica de saúde para exame ginecológico. Refere que há três anos submeteu-se a uma histerectomia simples por miomatose uterina sintomática que não respondeu ao tratamento clínico. No momento está assintomática. No exame físico, a cúpula vaginal está normal e no toque vaginal não se detecta nenhuma alteração. Qual a conduta mais apropriada:

- a) Colher citologia da cúpula vaginal.
- b) Realizar videocolposcopia.
- c) Colher citologia da cúpula vaginal e realizar videocolposcopia.
- d) Colher citologia da cúpula vaginal e ultrassonografia transvaginal para avaliar os ovários.
- e) Não há indicação para citologia da cúpula vaginal ou videocolposcopia.

QUESTÃO 37

É **CORRETO** afirmar sobre o câncer de ovário:

- a) Os tumores epiteliais ocorrem principalmente em pacientes jovens.
- b) Alfa-feto proteína é um marcador importante nos tumores de células epiteliais.
- c) A principal causa de aumento do marcador CA 125 após tratamento de câncer de ovário é a persistência de focos endometrióticos não ressecados.
- d) Tratamento cirúrgico com preservação do ovário contralateral e útero pode ser realizado em estágio inicial do câncer de ovário.
- e) O marcador HE4(*Human Epididymis Protein 4*) não têm nenhuma importância em câncer de ovário.

QUESTÃO 38

Paciente de 67 anos de idade procura unidade de saúde referindo prurido e irritação vulvar há dois anos. Nos últimos seis meses surgiu uma “ferida” que às vezes sangra. No exame clínico nota-se a presença de uma lesão ulcerada, com fundo necrótico localizado no grande lábio direito medindo 2x2 cm e presença de um linfonodo clinicamente tumoral na região inguinal direita. A principal hipótese diagnóstica e conduta são:

- a) Carcinoma epidermóide de vulva; ressecção ampla da lesão e linfonodectomia inguinal direita.
- b) Melanoma de vulva; vulvectomy radical com linfonodectomia inguinal bilateral.
- c) Carcinoma epidermóide de vulva; ressecção ampla da lesão e pesquisa do linfonodo sentinela .
- d) Carcinoma epidermóide de vulva; ressecção ampla da lesão e linfonodectomia inguinal bilateral.
- e) Melanoma de vulva; ressecção ampla com margens e pesquisa do linfonodo sentinela.

QUESTÃO 39

Dor pélvica crônica pode ser um desafio para o ginecologista. A congestão e varizes pélvicas podem determinar dor pélvica crônica. Qual o método padrão-ouro para o diagnóstico de varizes pélvicas quando há uma suspeita clínica forte?

- a) Venografia pélvica direta.
- b) Angioressonância magnética venosa.
- c) Ultrassonografia com Doppler.
- d) Tomografia com duplo contraste.
- e) Ultrassonografia com Doppler e com preparo intestinal.

QUESTÃO 40

Sobre a doença de Mondor é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) É uma tromboflebite da veia toracoepigástrica.
- b) O tratamento preferencial é a utilização de anti-coagulante.
- c) Regride em poucas semanas na maioria dos casos.
- d) Pode ser secundária a traumatismo.
- e) Pode ser secundária à radioterapia.