



PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIAS MÉDICAS



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 01

RESIDÊNCIAS MÉDICAS: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

DATA: 26/03/2023 – HORÁRIO: 8h30 às 10h30 (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno (**TIPO 01**) com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. *Verifique se o tipo de caderno (TIPO 01) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta.*

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e, em hipótese alguma, poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E). Assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma corresponde adequadamente à resposta correta. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**. Também serão nulas as marcações rasureadas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a esse respeito.
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES - PROVA OBJETIVA e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. O tempo de duração para esta prova é de **2h (duas horas)**.
12. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **1h30min** do início da prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destinando-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

PROCESSO SELETIVO - RESIDÊNCIA MÉDICA - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



PROCESSO SELETIVO – RESIDÊNCIAS MÉDICAS



Nº DE INSCRIÇÃO					



PEDIATRIA

- 01.** Considera-se mortalidade neonatal precoce a ocorrência de óbito em crianças
- de 10 a 60 dias.
 - de 0 a 6 dias.
 - de 15 a 40 dias.
 - de 7 a 30 dias.
 - de 15 a 30 dias.
- 02.** Pode-se considerar que uma criança tem baixa estatura em relação a idade e sexo quando seu comprimento/altura se encontra
- abaixo do terceiro percentil.
 - acima do terceiro percentil.
 - acima de 10% da média para idade e sexo.
 - 2 centímetros abaixo da média para idade e sexo.
 - 1 centímetro abaixo da média para idade e sexo.
- 03.** Criança com cariótipo 47, XY, +21 (trissomia do 21) possui a síndrome de
- Edwards.
 - Tunner.
 - Roberts.
 - Klinefelter.
 - Down.
- 04.** Para se obter a taxa de mortalidade infantil, divide-se o número de
- óbitos de menores de 1 ano de vida pelo número de nascidos vivos no mesmo local e período, multiplicando-se por 1.000.
 - óbitos de menores de 5 anos de vida pelo número de nascidos vivos no mesmo local e período, multiplicando-se por 10.
 - óbitos de menores de 2 anos de vida pelo número de habitantes no mesmo local e período, multiplicando-se por 1.000.
 - óbitos de menores de 1 ano de vida pelo número de nascidos vivos no mesmo local e período, multiplicando-se por 10.000.
 - óbitos de menores de 10 anos de vida pelo número de habitantes no mesmo local e período, multiplicando-se por 10.



- 05.** Considerando-se um recém-nascido (RN) prematuro com menos de 28 semanas de gestação, sexo masculino, filho de mãe diabética, o qual sofreu asfixia ao nascimento, podemos dizer que a patologia mais provável de acometer esse RN é
- a) Síndrome vasovagal.
 - b) Síndrome de desconforto respiratório por deficiência de surfactante alveolar.
 - c) Derrame pleural.
 - d) Pneumonia nosocomial.
 - e) Infecção urinária.
- 06.** O aleitamento materno é recomendado
- a) até 2 anos, sendo de forma exclusiva nos primeiros 3 meses.
 - b) até 1 ano, sendo de forma exclusiva nos primeiros 3 meses.
 - c) por 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva nos primeiros 6 meses.
 - d) por 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva nos primeiros 12 meses.
 - e) por 4 anos ou mais, sendo de forma exclusiva nos primeiros 12 meses.
- 07.** A respeito da vacinação na infância, assinale a alternativa correta.
- a) Crianças que não apresentarem a cicatriz vacinal após receberem a dose da vacina BCG não precisam ser revacinadas.
 - b) Ao contrário das vacinas de vírus vivos, as vacinas de bactérias vivas atenuadas são consideradas seguras e devem ser indicadas às crianças imunossuprimidas.
 - c) A vacina tetra viral corresponde à segunda dose da tríplice viral com a primeira dose da vacina pneumocócica.
 - d) A vacina contra a febre amarela é de bactéria viva atenuada.
 - e) A vacinação na infância tem pouca importância no desenvolvimento psicomotor da criança.
- 08.** Assinale a alternativa que indica fármacos que estão contraindicados para uso durante a amamentação.
- a) Amiodarona, antineoplásicos e imunossupressores.
 - b) Xaropes para tratamento da tosse.
 - c) Cremes ou pomadas para tratamento de feridas dérmicas.
 - d) Anti-hipertensivos.
 - e) Paracetamol e indometacina.



- 09.** Sobre maus-tratos na infância, assinale a afirmativa correta.
- a) Sofrer maus-tratos graves na infância não traz nenhum risco para o desenvolvimento de doenças psicológicas na vida adulta.
 - b) A saúde física e mental de um adulto pode sofrer consequências negativas oriundas de maus-tratos infantis, mesmo após muito tempo dos referidos eventos traumáticos.
 - c) Comportamento antissocial e agressivo nunca está relacionado à ocorrência de maus-tratos na infância.
 - d) Crianças até 3 anos não formam memória dos traumas que possam ter ocorrido até essa idade.
 - e) Nas regiões mais carentes do Brasil, ocorrem menos maus-tratos infantis, fato extremamente raro.
- 10.** A principal causa de glomerulonefrite na infância é
- a) glomerulonefrite difusa pós-estreptocócica aguda.
 - b) nefropatia por IgA de causa idiopática.
 - c) artrite séptica do joelho.
 - d) otite média.
 - e) faringite.

CLÍNICA MÉDICA

- 11.** Entre as principais causas da pancreatite aguda, encontram-se
- a) infecções urinárias e tabagismo.
 - b) tumores e uso de drogas injetáveis.
 - c) cálculos biliares e consumo excessivo de álcool.
 - d) uso de corticosteróides e sarcopenia.
 - e) osteoporose e ansiedade.
- 12.** São considerados como fatores importantes para rastreamento de diabetes tipo 2:
- a) antecedente familiar, alimentação com excesso de proteínas e ansiedade.
 - b) obesidade central, hipertensão arterial e sobrepeso.
 - c) ansiedade, insônia e sobrepeso.
 - d) alteração do sono, ansiedade e sedentarismo.
 - e) hipotensão arterial, ansiedade e faringites recorrentes.



13. No infarto do miocárdio, a dor
- a) é intensa e alivia com repouso.
 - b) só ocorre no paciente que já tem bloqueio átrio-ventricular.
 - c) sempre é desencadeada por esforço físico.
 - d) o infarto do miocárdio é geralmente indolor.
 - e) é prolongada e pode ser acompanhada de outros sintomas, como sudorese, náuseas e vômitos.
14. Sobre as infecções do trato urinário, assinale a alternativa **CORRETA**:
- a) Existe relação entre a constipação na criança e a infecção urinária de repetição.
 - b) Em escolares e pré-escolares que apresentem indicação de tratamento parenteral, como sinais de septicemia ou falha do tratamento via oral, o ciprofloxacino é o antibiótico de primeira escolha.
 - c) Considera-se infecção urinária de repetição quando o indivíduo apresenta quatro ou mais episódios de infecção urinária no período de um ano.
 - d) A infecção urinária atinge preferencialmente o sexo masculino (à proporção de cerca de 3:1), exceto durante o primeiro mês de vida, quando predomina no sexo feminino.
 - e) A infecção urinária é muito rara em mulheres acima de 60 anos.
15. Assinale a alternativa que **NÃO** indica manifestação suspeita de acidente vascular cerebral.
- a) Alteração visual súbita parcial ou completa.
 - b) Ocorrência de lesões escamosas em derme dos membros superiores.
 - c) Paresia, plegia e/ou parestesia súbitas.
 - d) Distúrbios súbitos da fala.
 - e) Dificuldades de deambular e falar.
16. Dentre as alternativas abaixo, **NÃO** é um critério utilizado para o diagnóstico de síndrome metabólica:
- a) dosagem de triglicerídeos.
 - b) dosagem de leucócitos
 - c) dosagem de glicemia de jejum.
 - d) dosagem de HDL-colesterol.
 - e) sintomas clínicos compatíveis com síndrome metabólica.



17. É uma manifestação essencial para caracterização de insuficiência hepática aguda:
- a) febre, mesmo que baixa.
 - b) diarreia.
 - c) encefalopatia.
 - d) hematúria.
 - e) amigdalite.
18. O exame considerado padrão-ouro para o diagnóstico clínico de tromboembolismo pulmonar é
- a) radiografia simples.
 - b) ultrassonografia.
 - c) arteriografia pulmonar.
 - d) biópsia.
 - e) hemograma.
19. Em relação à artrite reumatóide (AR), assinale a alternativa **INCORRETA**.
- a) O anticorpo anti-CCP é o mais específico para AR.
 - b) É uma oligomonoartrite simétrica de mãos, pés e punhos que ocorre quase exclusivamente em indivíduos jovens do sexo masculino.
 - c) É uma artrite que cursa com destruição articular, levando a deformidades.
 - d) Em geral, o acometimento articular poupa as interfalângianas distais.
 - e) A etiologia da AR tem relação com alterações no sistema imune do paciente.
20. Em um paciente com choque neurogênico, na maioria dos casos, a pressão arterial estará
- a) normal.
 - b) diminuída.
 - c) aumentada.
 - d) convergente (quando os valores sistólicos e diastólicos se aproximam).
 - e) divergente (quando os valores sistólicos e diastólicos se afastam).

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

21. Assinale a alternativa que apresenta os 5 princípios do SUS:
- a) universalização, equidade, integralidade, descentralização e participação popular.
 - b) particularidade, especificidade, integralidade, humanização e religiosidade.
 - c) políticas públicas, defesa social, centralização, defesa do idoso e humanização.
 - d) hierarquização, centralização, participação popular, especificidade e regionalização.
 - e) especificidade, segregação, hierarquização, integralidade, controle estatal.



22. Segundo os normativos vigentes do Ministério da Saúde, a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública inclui
- meningite viral, acidente com escorpião e leishmaniose visceral.
 - disenteria por *E. coli*, dengue com prova do laço positiva e cardiopatias em geral.
 - acidente com aranha-marrom, doença mão-pé-boca e parasitoses.
 - meningite meningocócica, toxoplasmose em idoso e violência contra o idoso.
 - faringites e amigdalites.
23. Aposentado de 83 anos debilitado por diabetes e Alzheimer mora com o filho. A equipe de Saúde da Família que o visita está suspeitando de que ele sofre maus-tratos físicos. Qual conduta essa equipe deve adotar?
- não se trata de caso de notificação ao SUS.
 - o caso deve ser notificado à polícia, que deve interrogar os familiares.
 - o caso deve ser notificado ao SINAN como violência interpessoal.
 - suspeita não pode ser notificada e, somente se houver confirmação, o caso deve ser notificado ao SUS como violência doméstica.
 - o caso deve ser notificado ao Ministério Público.
24. Assinale a alternativa verdadeira em relação à tuberculose.
- a vacina BCG deve ser aplicada ao nascer e protege contra as formas mais graves da doença.
 - os adultos vacinados quando crianças devem ser revacinados a cada 3 anos.
 - a vacina BCG confere imunidade completa e permanente contra a doença.
 - trata-se de uma doença que, no passado, foi altamente prevalente no Brasil, mas não se configura mais como um problema de saúde pública.
 - a vacina BGC não confere proteção contra a tuberculose, nem nas formas leves, nem nas formas graves.
25. Assinale a alternativa correta sobre o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde do Brasil.
- Os povos indígenas ainda não foram contemplados com cobertura vacinal através do PNI.
 - O PNI tem abrangência e operacionalização apenas na esfera estadual de gestão do SUS.
 - As infecções pelo *Haemophilus influenzae* tipo b recebem cobertura vacinal pelo PNI através da vacina pentavalente.
 - A Campanha de Erradicação da Varíola não foi bem sucedida, tendo permanecido focos importantes da infecção nas regiões Norte e Nordeste do país.
 - A vacina pentavalente do PNI garante a proteção contra difteria, tétano, sarampo, haemophilus influenza tipo B e rubéola.



26. O Praziquantel é o único fármaco disponível distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios para o tratamento da seguinte parasitose intestinal:
- a) esquistossomose.
 - b) ascaridíase.
 - c) enterobíase.
 - d) giardíase.
 - e) amebíase.
27. Qual destas doenças infecciosas **NÃO** é passível de prevenção no Brasil através de vacinação?
- a) caxumba.
 - b) sarampo.
 - c) rubéola.
 - d) hepatite B.
 - e) hepatite C.
28. Assinale a alternativa que melhor representa o princípio “integralidade” no Sistema Único de Saúde:
- a) Todos os serviços de saúde devem sempre ter caráter preventivo.
 - b) Os serviços de Saúde deverão manter unidas as ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde.
 - c) Os serviços de saúde devem ter apenas caráter curativo.
 - d) Todos os pacientes deverão ser tratados igualmente, sem considerar suas diferenças e peculiaridades.
 - e) Os serviços de saúde devem funcionar em horário diurno, atendendo apenas os pacientes mais graves.
29. O exame preventivo de câncer de colo de útero deve ser realizado
- a) em todas as mulheres, independentemente da idade.
 - b) anualmente.
 - c) em mulheres após os 25 anos de idade que já iniciaram atividade sexual.
 - d) em associação com a ultrassonografia transvaginal.
 - e) em toda população feminina acima de 10 anos de idade.



30. O principal fator de risco para a doença cardiovascular, o câncer e as doenças respiratórias crônicas é
- a) alcoolismo.
 - b) uso de drogas ilícitas.
 - c) sedentarismo.
 - d) alimentação rica em carboidratos.
 - e) tabagismo.

CIRURGIA GERAL

31. No pré-operatório de uma tireoidectomia total por carcinoma papilífero, a dosagem da tireoglobulina
- a) tem relação com a intensidade da doença metastática.
 - b) no pré-operatório, não é recomendada e não tem relação com o prognóstico.
 - c) altera completamente a conduta nos casos de indicação de iodo radioativo.
 - d) pode fazer o diagnóstico de doença metastática.
 - e) é mandatória no pré-operatório de qualquer tireoidectomia total.
32. Assinale a alternativa correta sobre enxertos de pele.
- a) O enxerto de pele total pode cobrir área bem maior que o de pele parcial.
 - b) Quando comparado ao enxerto de pele parcial, o enxerto de pele total. apresenta como vantagens a manutenção da textura original da pele, pouca retração do enxerto e melhor coloração.
 - c) Enxerto de pele parcial é aquele em que a estrutura é formada pela derme e epiderme.
 - d) O enxerto de pele parcial apresenta melhor qualidade de cobertura pós-cicatrização do que o enxerto de pele total.
 - e) nenhuma das alternativas anteriores.
33. Assinale a alternativa que apresenta contraindicação **ABSOLUTA** à cirurgia videolaparoscópica para apendicectomia.
- a) radioterapia em curso.
 - b) cirurgia pélvica prévia.
 - c) história prévia de coagulopatia.
 - d) infecção urinária.
 - e) infecção de vias aéreas superiores.
34. A artrodese tríplice do pé corresponde a
- a) artrodese das articulações subtalar, talonavicular e calcaneocubóidea.
 - b) artrodese das articulações subtalar, talocalcanea e calcaneocubóidea.
 - c) artrodese das articulações tibiotalar, talonavicular e calcaneocubóidea.
 - d) artrodese das articulações subtalar, naviculocalcanea e calcaneocubóide.
 - e) nenhuma das alternativas anteriores.



35. Qual a conduta mais apropriada para tratar uma fratura de maléolo lateral do tornozelo com ruptura da sindesmose em adultos?
- a) Imobilização gessada por 4 a 6 semanas.
 - b) Tração esquelética no leito por 4 a 6 semanas.
 - c) Redução cirúrgica e fixação, incluindo parafuso transindesmoidal.
 - d) Redução cirúrgica e fixação, sem o uso de parafuso transindesmoidal.
 - e) Apenas repouso no leito e anti-inflamatórios.
36. Qual o principal agente causador da osteomielite aguda?
- a) *Staphylococcus aureus*.
 - b) *Streptococcus* do grupo A.
 - c) *Pseudomonas aeruginosa*.
 - d) *Haemophilus influenzae*.
 - e) *Pasteurella multocida*.
37. Em relação às varizes em membros inferiores, assinale a alternativa correta.
- a) O fator genético não é predominante.
 - b) Os fatores ambientais não são importantes.
 - c) Quando a herança genética vem do pai, a patologia é mais agressiva.
 - d) Não existe tratamento para essa patologia.
 - e) O tratamento dessa patologia é feito exclusivamente com uso de meias de compressão.
38. Marque a alternativa que apresenta o nível da amputação de Syme, muito usada em casos de pé diabético grave.
- a) Transtibial.
 - b) Articulação calcâneo-navicular.
 - c) Articulação de Lisfranc.
 - d) Transmaleolar.
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.
39. Aneurisma é uma dilatação focal e permanente da artéria, com um aumento de pelo menos qual porcentagem do diâmetro normal do vaso?
- a) 5%.
 - b) 8%.
 - c) 10%.
 - d) 30%.
 - e) 50%.



40. Assinale a alternativa que melhor representa a incidência de lesões iatrogênicas da via biliar principal durante a colecistectomia videolaparoscópica, nos dias atuais.
- a) acima de 30%.
 - b) acima de 15%.
 - c) acima de 10%.
 - d) muito baixa, inferior a 1%.
 - e) muito alta, acima de 80%.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

41. Sobre a indicação de cesariana em uma gestação gemelar sem intercorrências, é correto afirmar o seguinte:
- a) A cesariana está indicada em todas as gestações gemelares.
 - b) A cesariana está indicada se o primeiro feto estiver em apresentação pélvica.
 - c) A cesariana está indicada apenas em gestações gemelares diamnióticas.
 - d) Não há indicação de cesariana pela gemelaridade. A via de parto deve ser definida, exclusivamente, pela idade gestacional dos conceptos.
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.
42. Em uma suspeita de pré-eclâmpsia, o ginecologista deve solicitar
- a) hemoglobina.
 - b) nível sérico de cálcio.
 - c) contagem de plaquetas.
 - d) velocidade de hemossedimentação.
 - e) ácido úrico.
43. Em relação à amniotomia, assinale a alternativa correta:
- a) É contraindicada nos casos de hemorragias da segunda metade da gravidez.
 - b) Tem indicação na correção de distócia funcional.
 - c) Deve ser realizada no pico da contração.
 - d) Deve ser feita de rotina com 5-7 cm.
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.
44. Paciente de 25 anos relata vários parceiros distintos no último ano e vai ao ginecologista com queixas de febre, adenopatia inguinal bilateral e pequenas úlceras vulvares bilaterais vermelhas e dolorosas. A principal hipótese diagnóstica é de
- a) herpes genital.
 - b) doença de Nicolas-favre.
 - c) cancro duro.
 - d) granuloma inguinal.
 - e) infecção urinária.



45. São indicações de parto cirúrgico, **EXCETO**
- a) risco iminente de rotura uterina.
 - b) condiloma acuminado obstruindo o canal de parto.
 - c) desproporção céfalo-pélvica.
 - d) descolamento de placenta com sofrimento fetal.
 - e) diabetes do tipo 2.
46. Sobre endometriose, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- a) A clínica predominante é a dor sob as formas de algia pélvica crônica, dismenorréia e dispareunia de profundidade.
 - b) Aparece com mais frequência a partir dos 30 anos de idade.
 - c) O marcador Ca 125 é o melhor indicador da endometriose avançada.
 - d) A endometriose das tubas uterinas corresponde à forma mais frequente da doença.
 - e) Acredita-se que a etiologia da endometriose é multifatorial.
47. Em relação ao mioma uterino, assinale a alternativa correta.
- a) O risco de mioma uterino aumenta com a paridade e com o tabagismo, sendo maior na raça negra.
 - b) O procedimento de embolização de um mioma uterino deve ser realizado sob anestesia geral.
 - c) Os miomas uterinos podem ocorrer na região mais externa do útero. (subserosos) ou no meio da parede do útero (intramurais), não ocorrendo na parte mais central do útero.
 - d) Não existe possibilidade de malignização de um mioma uterino.
 - e) nenhuma das anteriores.
48. Qual é a principal queixa que motiva a mulher a buscar por tratamento na menopausa?
- a) Fogacho.
 - b) Aumento do volume das mamas.
 - c) Alterações do paladar.
 - d) Dificuldade de concentração.
 - e) Poliúria.
49. Qual das estruturas abaixo não faz parte da genitália externa feminina?
- a) Ovário
 - b) Grandes lábios.
 - c) Pequenos lábios.
 - d) Glândulas vulvovaginais (ou de Bartholin).
 - e) Todas as alternativas acima fazem parte da genitália externa feminina
50. Qual o tipo histológico mais frequente no câncer de vulva?
- a) Sarcoma.
 - b) Melanoma.
 - c) Carcinoma epidermoide.
 - d) Carcinoma basocelular
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.